

Памятка по подготовкам к ультразвуковым исследованиям (УЗИ) и эластометрии печени.

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ

- Исследование не требует подготовки и может проводиться в любой день.
- Рекомендуется проводить с 4 по 10 день цикла. Также стоит отметить, что решение о том, на какой именно день цикла нужно пройти исследование принимает врач.

УЗИ ЖЕЛУДКА

- необходимо прекратить приём пищи и воды за 4-5 часов до исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.
- для оценки желудка в наполненном состоянии необходимо принести с собой бутылку негазированной воды объёмом 1 л.

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА

- за 3 дня до исследования необходимо исключить сырые овощи и фрукты, черный хлеб и сдобные изделия, бобовые, молочные и кисломолочные продукты, жирные сорта мяса и рыбы, алкогольные и газированные напитки. При повышенном газообразовании рекомендуется принять Эспумизан или Мотилегаз форте (согласно инструкции).
- необходимо прекратить приём пищи за 4-5 часов, воды – за 2 часа до начала исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.
- УЗИ желчного пузыря с определением функции
- необходимо прекратить приём пищи за 4-5 часов, воды – за 2 часа до начала исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.
- на исследование необходимо принести желчегонный препарат (Урсосан, Урсофальк или Урсодез), либо жирную пищу (сливки 15%, сметану 15-20%, 2 яйца и т.п.)

УЗИ ПОЧЕК

- ограничений по приёму пищи и жидкости нет.

УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- проводится при полном мочевом пузыре, поэтому за 1-1,5 часа до исследования нужно принять около 1 - 1,5 литров жидкости.
- необходимо воздержаться от мочеиспускания за 2 часа до исследования.

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

- Исследование не требует подготовки и может проводиться в любой день.
- Рекомендуется проводить на 4-7 день цикла. Также стоит отметить, что решение о том, на какой именно день цикла нужно пройти исследование принимает врач.
- Фолликулометрия проводится трёхкратно в течение месяца. Точные даты исследований определяет лечащий врач.

УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- за 3 часа до начала исследования необходимо прекратить приём пищи.
- при отсутствии стула в день исследования, за 3 часа до его начала необходимо однократно поставить микроклизму Микролакс.
- за 1-1,5 часа до исследования нужно принять около 1 - 1,5 литров жидкости.
- необходимо воздержаться от мочеиспускания за 2 часа до исследования.

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА) И УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИИ

- за 3 дня до исследования необходимо исключить сырые овощи и фрукты, черный хлеб и сдобные изделия, бобовые, молочные и кисломолочные продукты, жирные сорта мяса и рыбы, алкогольные и газированные напитки. При повышенном газообразовании рекомендуется принять Эспумизан или Мотилегаз форте (согласно инструкции).
- необходимо прекратить приём пищи за 4-5 часов, воды – за 2 часа до начала исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.
- на исследование необходимо принести желчегонный препарат (Урсосан, Урсофальк или Урсодез), либо жирную пищу (сливки 15%, сметану 15-20%, 2 яйца и т.п.)

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА) И УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- за 3 дня до исследования необходимо исключить сырые овощи и фрукты, черный хлеб и сдобные изделия, бобовые, молочные и кисломолочные продукты, жирные сорта мяса и рыбы, алкогольные и газированные напитки. При повышенном газообразовании рекомендуется принять Эспумизан или Мотилегаз форте (согласно инструкции).
- необходимо прекратить приём пищи за 4-5 часов, воды – за 2 часа до начала исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.
- необходимо воздержаться от мочеиспускания за 2 часа до исследования.

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА) И УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- за 3 дня до исследования необходимо исключить сырые овощи и фрукты, черный хлеб и сдобные изделия, бобовые, молочные и кисломолочные продукты, жирные сорта мяса и рыбы, алкогольные и газированные напитки. При повышенном газообразовании рекомендуется принять Эспумизан или Мотилегаз форте (согласно инструкции).
- необходимо прекратить приём пищи за 4-5 часов, воды – за 2 часа до начала исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.
- при отсутствии стула в день исследования, за 3 часа до его начала необходимо однократно поставить микроклизму Микролакс.
- за 1-1,5 часа до исследования нужно принять около 1 - 1,5 литров жидкости.
- необходимо воздержаться от мочеиспускания за 2 часа до исследования.

ЭЛАСТОМЕТРИЯ / СОНОЭЛАСТОМЕТРИЯ / ЭЛАСТОГРАФИЯ / СОНОЭЛАСТОГРАФИЯ ПЕЧЕНИ

- необходимо прекратить приём пищи за 4-5 часов, воды – за 2 часа до начала исследования.
- допускается приём жизненно необходимых препаратов с небольшим количеством обычной воды.

📍 г. Чебоксары, Приволжский б-р, 1

📞 legamed21 🌐 legamed21.ru

📞 59-03-03, 45-01-01

8-960-310-03-03



клиника
ЛЕГАМЕД

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА