

Памятка по прохождению **эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта под внутривенной седацией**

для проведения эндоскопических исследований под седацией предварительно необходимы:

- лабораторные анализы, такие как: общий анализ крови с СОЭ, глюкоза, АЛАТ, АСАТ, креатинин, мочевины, общий белок, билирубин общий, холестерин. Срок действия-10 дней.
- ЭКГ с расшифровкой результатов. Срок действия-10 дней.
- с готовыми результатами пройти консультацию врача-терапевта.
- далее с результатами лабораторных анализов, ЭКГ и заключением врача-терапевта пройти консультацию врача-анестезиолога.

Для Вашего комфорта все необходимые исследования и консультации можно пройти в нашей клинике. Консультация врач-анестезиолога перед исследованием проводится только в нашей клинике.

ПОДГОТОВКА К ЭНДСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОД ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИЕЙ

1. Последний приём пищи должен быть не позднее чем за 8 часов накануне исследования с соблюдением рекомендаций врача-эндоскописта.
2. Приём жидкости необходимо прекратить за 2 часа до исследования с соблюдением рекомендаций врача-эндоскописта.
3. В день исследования необходимо принять жизненно важные препараты, назначенные Вашим лечащим врачом, запивая небольшим количеством воды. За исключением тех препаратов, которые отменил врач-анестезиолог на предварительной консультации.
4. В день исследования разрешается почистить зубы.
5. Перед исследованием необходимо извлечь из ротовой полости все съёмные предметы (зубные протезы, пирсинг) и снять все имеющиеся украшения.
6. Ногти на руках должны быть свободны от маникюрного лака.
7. Перед исследованием запрещается курить за 4 часа до его начала.

Также просим внимательно ознакомиться с памяткой по подготовке к Вашему эндоскопическому исследованию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОД ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИЕЙ, ДЕЙСТВУЮТ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. **Запрещены все виды деятельности, требующие повышенного внимания:**
 - управление автомобилем и прочими транспортными средствами;
 - работа со сложным техническим оборудованием, которое при неправильной его эксплуатации может представлять опасность для Вашего здоровья.
2. **Настоятельно рекомендуется:**
 - отказаться от ходьбы пешком и прогулок в день после исследования;
 - не использовать общественный транспорт в день после исследования;
 - не принимать важных решений, в том числе подписывать важные документы
 - обеспечить себе сопровождающего на время исследования и после для сопровождения Вас домой.
3. **Запрещается принимать:**
 - алкогольные напитки;
 - препараты, не согласованные с врачом-анестезиологом и лечащим врачом.
4. **Рекомендуется употреблять жидкости** не ранее, чем через 1,5 - 2 часа после завершения небольшими глотками с перерывами. Если ощущение тошноты отсутствует, можно продолжать пить и начать приём пищи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА