

Подготовка к проведению исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства

1. За сутки перед исследованием исключить из рациона грубую клетчатку (капуста и т.д., фрукты), газированные напитки, черный хлеб, кисломолочные продукты, вызывающие газообразование.
2. За два дня до исследования необходимо принимать «Активированный уголь» в расчете 2 таблетки на 10 кг массы тела (или «Эспумизан» по 2 таблетки 3 раза в день) за два дня до исследования – для устранения повышенного газообразования.
3. Исследование проводится натощак (последний прием пищи не позже, чем за 6-8 часов до начала исследования).
4. Вечером перед исследованием и за 30-40 минут до начала исследования принять 2 таблетки «Но-шпа».
5. С собой необходимо принести 0,5л воды без газа.

! Если Вы записаны на КТ-исследование брюшной полости и забрюшинного пространства, необходимо прекратить приём пищи за 4-6 часов до его начала. Принятие жидкости (воды) не запрещается.

! Если Вы записаны на КТ-исследование брюшной полости и забрюшинного пространства, то принимать «Активированный уголь» или «Эспумизан» нет необходимости.



**ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ЛЕГАМЕД**



**ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ЛЕГАМЕД**



8 (8352) 59-06-06

ул. Гузовского, 17А
ул. Павлова, 10А

пр-т Мира, 37



mrt21.ru



ktlegamed

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА